



Guía de Medicamentos Autorizados para el abordaje del Gusano Barrenador

La salud de la ganadería nacional y la seguridad de los consumidores son prioridades fundamentales para este Ministerio. Por ello, es importante conocer los productos que se encuentren autorizados por el departamento de Registro de Insumos para Uso en Animales (DRIPUA) de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR/MAGA.

La presente tabla de medicamentos y tiempos de retiro ha sido elaborada con fines estrictamente informativos y de orientación técnica para apoyar la lucha contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG). El usuario es el único responsable de leer y seguir las instrucciones contenidas en la etiqueta y el panfleto original del fabricante adheridos al envase del producto. En caso de discrepancia entre esta tabla y la etiqueta del producto, siempre prevalecerá la información de la etiqueta. El uso de los productos aquí listados debe realizarse preferentemente bajo la supervisión de un Médico Veterinario colegiado activo. El MAGA no se hace responsable por el mal uso, sobredosificación o aplicación en especies no autorizadas. La estructura de la tabla de medicamentos se encuentra conformada por cinco columnas, donde encontrará el Producto (nombre comercial), la especie de destino, el principio activo, la clasificación del producto y el tiempo de retiro.

El tratamiento eficaz no solo consiste en eliminar la larva, sino en hacerlo de manera responsable. Por ello, es obligatorio respetar el **TIEMPO DE RETIRO**: siendo el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación del medicamento y el destino del animal para consumo humano (Carne) o la recolección de su leche. Generalmente, los productos que **no** se recomiendan para vacas en lactación (Leche), también están contraindicados para los últimos tres meses de gestación.

Nota de Seguridad: Los tiempos de retiro indicados a continuación son referencias estándar basadas en los principios activos y formulaciones. Siempre verifique la etiqueta del envase del producto específico, ya que la concentración y el vehículo pueden variar con respecto al tiempo exacto.

El MAGA no será responsable por pérdidas económicas, daños a la salud animal, decomisos de productos alimenticios o cualquier perjuicio derivado de la interpretación errónea o aplicación inadecuada de la información aquí presentada.

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
ACTYL POUR ON	Bovinos	Fipronil	Desparasitante externo	Carne 50 días. No usar en leche ni en animales menores de 10 semanas.

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
ACTYL POUR ON	Bovinos	Fipronil	Desparasitante externo	Carne 50 días. No usar en leche ni en animales menores de 10 semanas.
AMIRVOSS	Bovinos, Caninos, Ovinos, Porcinos	Amitraz y fipronil	Ectoparasitica	Carne 14 días. Leche 24 horas.
AREUMYCINA VIOLETA SPRAY	Caninos, Felinos	Neomicina y violeta de genciana	Antibiótico y cicatrizante	NO APLICA
ATRAFIX FC POUR ON	Bovinos	Cipermetrina y fluazurón	Ectoparasitica	Carne 45 días. No usar en leche.
AVALANCHE	Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos	Cipermetrina	Desparasitante externo	Carne y leche 48 horas.
AVALANCHE	Bovinos, Cerdos, Equinos, Ovinos	Cipermetrina y butoxido de piperonilo	Ectoparasitica	Carne y leche 48 horas.
AZULER	Aves Ornamentales, Aves de Combate, Bovinos, Caninos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Felinos, Ovinos	Fenol y violeta de genciana	Antimiásico, Antiséptico, Repelente y Cicatrizante	Carne 28 días. No usar en leche.
BAÑAMAX	Bovinos	Cipermetrina	Ectoparasitica	Carne 2 días. No se especifica un tiempo para leche.
BAÑOGAN	Bovinos	Fipronil	Desparasitante externo	Carne 100 días. No usar en leche.
BIOMECTRINA 15%	Bovinos	Cipermetrina	Ectoparasitica	Carne: 48 horas Leche: 24 días
CALIFLY PLUS	Bovinos, Cerdos, Equinos	Cipermetrina	Desparasitante externo	Carne 6 días.
CALIFLY PLUS	Bovinos, Cerdos, Equinos	Cipermetrina, butoxido de piperonilo y carbaril	Desparasitante externo	Carne 7 días.
CALIMIX	Bovinos	Cipermetrina y ethion	Desparasitante externo	Carne 21 días.
CIDENTAL UNGUENTO	Bovinos	Cihalotrina	Ectoparasitica y Cicatrizante	Carne 6 días.
CIDENTAL PO	Bovinos	Propoxur y clorpirifos	Ectoparasitica	Carne 11 días. Leche 1 día.

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
CIPER CLOR	Bovinos de Doble Proposito, Bovinos de Leche, Caninos Adultos, Equinos Deportivos, Equinos de Trabajo	Cipermetrina	Antimiásico, Antiséptico, Repelente y Cicatrizante	Carne 7 días. Leche 48 horas.
CIPERMETRINA 15 EC AUROFARMA	Bovinos	Cipermetrina	Desparasitante externo	Carne 48 horas. Leche 48 horas.
CIPERMETRINA CARVAL	Bovinos	Cipermetrina	Ectoparasitocida	Carne 2 días. Leche 1 día.
CLOREXIVET SOLUCION	Caninos, Felinos	Clorhexidina	Antiséptico	NO APLICA
CLORHEXIDIN PLUS	Caninos, Felinos	Clorhexidina y acetonido triamcinilona	Antiséptico dermatológico	NO APLICA
CLORHEXIDINA 0.5%	Aves, Bovinos, Caninos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Felinos, Ovinos	Clorhexidina	Antiséptico, desinfectante, uso general	NO APLICA
CLORHEXIDINA CALOX 0.5% SPRAY	Bovinos, Caninos, Caprinos, Equinos, Felinos, Ovinos, Porcinos	Clorhexidina	Antiséptico	NO APLICA
CLORHEXY PET TOPIC	Caninos, Felinos	Clorhexidina	Antiséptico	NO APLICA
CURABICHERAS GALMEDIC AEROSOL	Bovinos, Caninos, Equinos, Ovinos	Cipermetrina ,Diclorvós	Ectoparasitocida	Carne y leche 10 días.
CURAMIC Ag	Bovinos, Caninos, Caprinos, Equinos, Ovinos, Porcinos	Cipermetrina, sulfadiazina, butoxido de piperonilo y aluminio	Cicatrizante, antiséptico y repelente	Carne 6 días.

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
CURAVET	Terneros	Diclorvos, acido pícrico, iodoformo	Antiséptico, cicatrizante y antibiótico de uso tópico	Carne 7 días. Leche 12 horas.
CURAVET PLATA AEROSOL	Bovinos, Caninos, Cerdos, Equinos, Felinos	Fenitron + aluminio y clorhexidina	Antimiásico, Antiseptico, Repelente y Cicatrizante	Carne 14 días. Leche 12 horas.
CURAVET PLATA CREMA	Caninos, Felinos	Sulfadiazina de plata, aluminio, cipermetrina y butoxido de piperonilo	Cicatrizante, antiséptico y repelente	Carne 2 a 7 días. Leche 12 horas.
CYPERTHION	Bovinos	Cipermetrina, ethion	Desparasitante externo	Carne 10 días. Leche 12 horas.
DERRAMIN PLUS	Bovinos	Cipermetrina, Clorpirifos Butoxido de piperonilo	Ectoparasitida	Carne 35 días. Leche 12 horas.
DERRAMIN POUR-ON	Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos	Cipermetrina	Ectoparasitida	Carne y Leche 6 días.
DUOTAK FF	Bovinos	Fipronil y Fluazurón	Desparasitante externo	Carne 100 días. No usar en leche.
ECTOBULL	Bovinos	Fipronil	Ectoparasitida	Carne 100 días. No usar en leche.
ECTOFIP POUR ON	Bovinos	Fipronil y fluazuron	Ectoparasitida	Carne 100 días. No usar en leche.
ECTOGAN	Bovinos, Equinos, Porcinos	Cipermetrina	Desparasitante externo	Carne y leche 2 días.
ECTOGAN FORTE	Bovinos, Equinos, Porcinos	CIPERMETRINA / DICLORVOS	Ectoparasitida	Carne y leche 48 horas.
ECTOGAN PETS	Caninos, Felinos	Clorpirifos, Cipermetrina	Ectoparasitida	NO APLICA
ECTOGAN POUR ON	Bovinos	Fipronil	Desparasitante externo	Carne 100 días. No usar en leche.

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
ECTOLAB DUO POUR ON	Bovinos, Camélidos sudamericanos, Caninos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Felinos, Ovinos	Fipronil, ivermectina	Ectoparasitocida	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.
ECTOLINE	Bovinos	FIPRONIL	Ectoparasitocida	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.
ECTOLINE SPRAY	Bovinos	FIPRONIL, sulfadiazina y aluminio	Larvicida	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.
ECTOMETHRIN 200	Aves, Bovinos, Caninos, Caprinos, Equinos, Ovinos, Porcinos	Cipermetrina	Ectoparasitocida	Carne y leche: 48 hrs.
ECTOSULES PLUS BAÑO	Bovinos	Cipermetrina, Ethion	Ectoparasitocida	Carne: 15 días, Leche: 48 horas.
EFFIPRO BOVIS	Bovinos de Carne	Fipronil	Ectoparasitocida	83 días.
EKTOKO	Bovinos, Caninos	Cipermetrina	Ectoparasitocida	Tópico (spray/polvo): carne 2 a 7 días, leche 6 horas. Baño de inmersión/aspersión: carne 2 a 14 días, leche 48 horas. Pour on (dorsal): carne 3 a 28 días, 6 horas.
ESPANTAR SOLUCION	Bovinos, Instalaciones pecuarias	Cipermetrina, bioxido de piperonilo	Desparasitante L.A.	Carne y leche 48 horas
FIPECTO POUR ON	Bovinos	Fipronil	Ectoparasitocida	Carne 100 días. No usar en leche.
FIPROCHERRY	Bovinos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Ovinos	Fipronil	Desparasitante externo	100 días.
FIPROMIL	Bovinos	Fipronil	Ectoparasitocida	Carne 154 días. No usar en leche.
FIPRONEX G5	Caninos	Fipronil, permetrina y butoxido de piperonilo	Desparasitante externo	NO APLICA
FIPRONIL POUR ON GANADO	Bovinos	Fipronil	Ectoparasitocida	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
FIPROSULES SPRAY	Bovinos, Caninos, Equinos, Felinos, Ovinos, Porcinos	Fipronil, sulfadiazina y aluminio	Antiséptico, desinfectante, bactericida, cicatrizante (spray)	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.
FULMI CYP	Bovinos, Caninos, Caprinos, Cerdos, Ovinos	Cipermetrina, permetrina citronela	Ectoparasitocida	Carne 10 días. No usar en leche.
GANAFORT POUR ON	Bovinos	Cipermetrina ethion	Ectoparasitocida	Carne 50 días.
GARRAMOS	Bovinos	Cipermetrina Técnica	Ectoparasitocida	Carne 48 horas después de finalizado el tratamiento. Leche 1 día después de finalizado el tratamiento.
GARRATHION	Bovinos, Equinos, Ovinos	Cipermetrina, Ethion	Ectoparasitocida	Carne y leche 2 días.
GUSANTROL AEROSOL	Bovinos, Caninos, Cerdos, Equinos, Ovinos	Clorpirifos y violeta de genciana	Antimiásico, Antiséptico, Repelente y Cicatrizante	Carne 14 días. Leche 24 horas.
GUSANTROL N.F. UNGÜENTO	Bovinos, Caninos, Caprinos, Conejos, Equinos, Ovinos, Porcinos	Triclorfón+fenol.	Desparasitante externo	Carne 14 días. Leche 24 horas.
GUZA INPEL	Bovinos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Ovinos	Cipermetrina, diclorvos y fipronil	Desparasitante externo	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.
HEALTHY VET CICATRYSAN	Caninos	Violeta de genciana, oxitetraciclina	Antiséptico y Cicatrizante	NO APLICA
IMPACTO LOMO	Bovinos	CIPERMETRINA / CLORPIRIFOS	Ectoparasitocida	Carne 37 días. Leche 5 días
IMPACTO OUROFINO	Bovinos, Instalaciones pecuarias	CIPERMETRINA / CLORPIRIFOS	Ectoparasitocida	Carne 10 días. Leche 52 horas.
IMPACTO PULVERIZACIÓN	Aves, Bovinos, Porcinos	Cipermetrina+clorpirifos +citronela.	Ectoparasitocida	Carne 10 a 16 días. Leche 52 a 72 horas.

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
KERKUS GANADERO CURABICHERA	Bovinos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Ovinos	Cipermetrina, violeta genciana, acido salicilico	Ectoparasitocida y Cicatrizante	Carne 2 a 7 días.
KIL AG	Bovinos, Caninos, Caprinos, Equinos, Ovinos, Porcinos	Clorpirifos, Cipermetrina y sulfadiazina	Ectoparasitocida y Cicatrizante	NO APLICA
KIROSEPTIC SPRAY	Caninos, Felinos	Digluconato de clorhexidina	Antiséptico dermatológico	NO APLICA
KYROGUSAN	Bovinos, Cerdos, Equinos, Ovinos	Cipermetrina	Larvicida	Carne 15 días. No usar en leche.
LONTAL POUR ON	Bovinos	Triclorfon	Ectoparasitocida	Carne 14 días. Leche 24 horas.
MATAGUSANOS	Bovinos, Caprinos, Cerdos, Ovinos	Cipermetrina, fenol y fucsina	Larvicida	Carne 7 días. Leche 12 horas.
MOOZK SOLUCION	Bovinos	Cipermetrina y butoxido de piperonilo	Ectoparasitocida	Carne 48 horas. Leche 24 horas.
NUTRI-CLORHEXIDIN	Bovinos, Caninos, Cerdos	Clorhexidina	Antiséptico y Cicatrizante	NO APLICA
OXITETRACICLINA TÓPICA	Caninos, Equinos, Felinos	Oxitetraciclina, violeta de genciana,	Antibiótico y cicatrizante	NO APLICA
PAREDÓN	Aves, Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos	Cipermetrina	Ectoparasitocida	Carne: 2 días Leche: 24 horas
PENTOX-R	Bovinos, Caninos, Caprinos, Equinos, Felinos, Ovinos	Cipermetrina	Desparasitante externo	Segun fabricante no es necesario
POUR METRIN BT	Bovinos, Ovinos, Porcinos	Cipermetrina, Butoxido de piperonilo, Triclorfon	Ectoparasitocida	Carne 14 días.
PROTECH SPRAY	Caninos	Fipronil, Piriproxifeno, Permetrina, butoxido de piperonilo	Ectoparasitocida	NO APLICA

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
ROCHY CURABICHERAS PASTA	Bovinos, Caninos, Equinos	Fipronil, clorhexidina	Antimiásico, Antiséptico, Repelente y Cicatrizante	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.
ROCHY CURABICHERAS AEROSOL	Bovinos, Caninos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Felinos, Ovinos	Clorhexidina, fipronil	Antimiásico, Antiséptico, Repelente y Cicatrizante	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.
ROCHY CURABICHERAS CREMA	Bovinos, Caninos, Equinos	Fipronil, clorhexidina	Antimiásico, Antiséptico, Repelente y Cicatrizante	Carne 100 - 122 días. No usar en leche.
SANITOR FORTE	Caninos, Felinos	Clorhexidina	Antiséptico, desinfectante, uso general	NO APLICA
SUPER VIOLETA	Bovinos, Caninos, Cerdos, Felinos	Violeta de genciana y oxitetraciclina	Antiséptico y Cicatrizante	NO APLICA
SUPERHION	Bovinos	FIPRONIL Y FLUAZURON	Ectoparasitocida	Carne 54 días. No usar en leche.
SUPERMETRINA POUR ON	Bovinos	Cipermetrina, Ethion	Ectoparasitocida	Carne 6 a 15 días. Leche 48 horas.
SYNECT PLATA	Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos	Diclorvós y sulfadiazina	Ectoparasitocida y Cicatrizante	Carne 3 días. No usar en leche.
TEK POUR ON	Bovinos	Fluarzurón, cipermetrina, clorpirifos	Ectoparasitocida	Carne 56 días. No usar en leche.
TERMINATOR	Bovinos	Cipermetrina	Ectoparasitocida	Carne 48 horas. Leche 24 horas.
TINO	Bovinos	Cipermetrina y butoxido de piperonilo	Ectoparasitocida	Carne 48 horas. Leche 24 horas.
ULTRAMETRIN POUR ON	Bovinos, Camélidos sudamericanos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Ovinos	Cipermetrina, ethion	Ectoparasitocida	Carne 15 días. Leche 48 horas
UNITOX	Multiespecies	Cipermetrina	Ectoparasitocida	Carne 48 horas. Leche 24 horas.

PRODUCTO	ESPECIE DESTINO	PRINCIPIO ACTIVO	CLASIFICACION	TIEMPO DE RETIRO
UNITOX PLUS	Aves, Bovinos, Caninos, Caprinos, Cerdos, Equinos, Ovinos	Cipermetrina y butoxido de piperonilo	Ectoparasitocida	Carne 6 dias. Leche 1 dia.
UNITOX PLUS POUR ON	Bovinos	Cipermetrina y butoxido de piperonilo	Ectoparasitocida	Carne 8 días. Leche 24 horas.
VAXY DERM	Bovinos, Caninos, Equinos, Felinos	Clorhexidina	Antiséptico	NO APLICA
VIOSAN	Bovinos, Caninos, Cerdos, Equinos, Felinos, Pollo finalizador, Pollo iniciador	Violeta de genciana y neomicina	Antiséptico y Cicatrizante	NO APLICA